

Hipoglós®

cicatrizante

Ácido Bórico
Óxido de Zinc
Undecilenato de Zinc

polvo 40g

USO EXTERNO

Venta bajo receta - Industria Argentina

Fórmula: Cada 100 g contiene:
Undecilenato de Zinc 3,00 g; Propionato de Sodio 1,00 g; Diiodohidroxiquinolina 1,00 g; Ácido Bórico 2,00 g; Óxido de Zinc 20,00 g; Excipientes (Talco c.s.p. 100 g).

Acción terapéutica:

Cicatrizante, antiséptico y protector dérmico.

Indicaciones:

- Dermatitis
- Protección de la piel agrietada o irritada
- Escaras
- Picaduras de insectos
- Urticaria
- Erupciones cutáneas
- Heridas
- Excoriaciones
- Hiperhidrosis
- Bromhidrosis
- Úlceras varicosas
- Heridas quirúrgicas
- Lesiones por rascado

Características farmacológicas / Propiedades:

Acción farmacológica: El Undecilenato de Zinc se utiliza en el tratamiento de infecciones dermatofíticas superficiales. Es fungicida y fungistático sobre hongos del género *Trichophyton*, *Epidermophyton* y *Microsporum*. Posee acciones bacteriostáticas y bactericidas sobre estafilococos y estreptococos. Ejerce una acción astringente que ayuda a suprimir la inflamación.
El Propionato de Sodio posee acción fungicida y usualmente se lo utiliza en combinación con otros agentes antimicrobianos para el tratamiento de infecciones provocadas por hongos de los géneros *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum* y *Candida albicans*.
La Diiodohidroxiquinolina posee acción antibacteriana y antifúngica que se debe al núcleo de la hidroxiquinolina, reforzado por la presencia de átomos de yodo.

Farmacocinética: Protector dérmico que resulta una terapéutica útil al reducir el riesgo de infecciones bacterianas y micóticas. Sus componentes actúan sinérgicamente sobre la superficie lesionada.

Posología

Modo de empleo: Aplicar sobre el área afectada 3 a 4 veces por día, hasta la completa remisión de los síntomas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Advertencias:

Solo para uso externo.

Precauciones:

Evitar el contacto con los ojos. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus componentes, especialmente aquellos sensibles al yodo y las hidroxiquinolinas halogenadas. Debe usarse con precaución en pacientes con enfermedades tiroideas.

Reacciones adversas:

Debido a la Diiodohidroxiquinolina, se le puede atribuir varias formas de erupciones de la piel, urticaria y prurito; y muy raramente fiebre, resfrió y alargamiento de la glándula tiroidea.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el Centro Toxicológico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666 / 2247; Hospital A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

Presentación:

Talquera con 40 gramos.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

E.M.A.M.S. Certificado Nº 11.461.

Dir. Téc.: Juan. A. Zubiaga, Farmacéutico. Elaborado en Int. A. Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Pcia. de Buenos Aires.

Fecha de última actualización del prospecto: 11/02.

En Paraguay: Importado por POLIMED S.A. Tte. Rojas Silva 1043 esq. M.O. Guerrero 1º Piso, Asunción - Paraguay. Autorizado por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Certificado Nº 03051-05-EF. Q.F. Delma Larrosa, Reg. Prof. Nº 1499. Teléfono (595 21) 248 0188. E-mail: pielandromaco@polimed.com.py
Ante alguna eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología: Teodoro S. Mongelós y Gral. Santos, Asunción. Tel. 204 800, 204 908, 203 113.

Servicio de Atención al Consumidor:

0800 333 0033
contacto@andromaco.com.ar
www.andromaco.com



PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN DEL ENVASE POR BEBÉS Y NIÑOS. POR PRECAUCIÓN ASEGURAR EL CIERRE CORRECTO DE LA TAPA.



Andrómaco

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huerdo 1145 - C1107AOL - Bs. As.