

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si coloqué más de la cantidad necesaria?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247;
- Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Tel. (011) 4307-4788/5442;
- Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648/4658-7777.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:
ANMAT Responde: 0800 333 1234.

Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Conservar a temperatura ambiente menor de 25°C.

Eventualmente, puede presentarse una pequeña separación de líquido que proviene de los componentes de la pomada, lo cual no afecta la calidad del producto.

Presentaciones:

Envases conteniendo 50 y 100 g.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 22.626.

Director Técnico: Juan A. Zubiaga, Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto:
08/2024.

PR 1019616 - PH 285

En Paraguay: Importado por POLIMED S.A. Tte. Rojas Silva Nº 1043 esq. Manuel Ortiz Guerrero, 1er. Piso, Asunción. Aut. por D.N.V.S. del M.S.P y B.S. Cert. Nº 06432-05-EF. Q.F. Delma Larrosa, Reg. Prof. Nº 1499. Marca Bajo Licencia de Montserrat Invest. Co. Inc. Tel. [595 21] 233 600/1. E-mail: piel@andromaco.com.py

 Industria Argentina



Andrómaco

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
Av. Ing. Huergo 1145 - C1107AOL - Bs. As.



Hipoglós®

Vitamina A - Óxido de Zinc - Ácido Bórico

Hipoglós®



Vitamina A - Óxido de Zinc - Ácido Bórico

POMADA

**Vía de administración tópica.
Venta libre.**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

¿Qué contiene HIPOGLÓS pomada?

Cada 100 g contiene: Vitamina A Palmitato (proveniente de Aceite de Hígado de Peces, incluyendo 2% de Aceite de Hígado de Bacalao) 600.000 U.I.; Ácido Bórico 2,0000 g; Óxido de Zinc 15,0000 g; Excipientes (Cloruro de Bencetonio; Butilhidroxianisól, Butilhidroxitolueno, Lanolina, Talco, Vainillina, Vaselina Sólida, Agua Purificada) c.s.

HIPOGLÓS pomada posee acción cicatrizante, antiséptica y regeneradora de la piel.

¿Para qué se usa HIPOGLÓS pomada?

Se usa para el alivio local de las raspaduras, dermatitis (eczemas, dermatitis del pañal); para enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (irritaciones menores, quemaduras leves, úlceras por decúbito).

¿Qué personas no pueden utilizar HIPOGLÓS pomada?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

¿Qué cuidados debe tener antes de utilizar HIPOGLÓS pomada?

Dada la sensibilidad de la piel o si las lesiones son muy extensas se deben evitar las compresas o la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones dado que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la Vitamina A.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o ante cualquier duda, consulte a su médico antes de utilizarlo.

¿Qué cuidados debe tener mientras está utilizando HIPOGLÓS pomada?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada, o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ej. mucosa nasal). Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A.

¿Cómo se usa HIPOGLÓS pomada?

Aplicar sobre la zona a tratar dos o tres veces por día, según se requiera.

Ante la aparición de nuevos síntomas o de no remitir la sintomatología inicial consultar con su médico inmediatamente.